

TN-AVANTAGE CT-1L-LABEL-20180130

SIZE:278(W)X138(H)MM

المادة الفعالة: 500 غ/ل من مادة الكلوروثالونيل و 100 غ/ل من مادة الديميثومورف على شكل مركز معلق

الإستعمال الفلاحي:

الزراعة	المرض	مقدار الاستعمال	فترة ما قبل الجني
البطاطا	الميلديو	150 مل/هل	14 يوم
البطيخ	الميلديو	150 مل/هل	

الإحتياطات والإسعافات الأولية نرجو مراجعة النشرة المرفقة في الداخل لمزيد من المعلومات يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

منتج من طرف: روطام أفروشيماكال ليمتد
أونيت 6، F/26 تراند سونتر، 29 شارع شونغ لي شايوان، هونغ كونغ.



تاريخ الإنتاج:

رقم التصنيع:



AVANTAGE CT®

أفونتاج ست



Fongicide préventif et curatif pour lutter contre le mildiou

مبيد فطري جهازي

Homologation N°: F.002-17 : رخصة بيع رقم

العبوة : 1ل **Contenance : 1L**

Date de fabrication:
N du lot:

تاريخ الإنتاج:
رقم الخلطة:



Trademark of Rotam CropSciences Limited

Matière active: Contient 500g/l Chlorothalonil et 100g/l Dimethomorphe sous forme de suspension concentrée (SC)

Usage Agricole:

Cultures	Maladie	Dose	DAR
Pomme de terre	Mildiou	150 ml/hl	14 Jours
Melon	Mildiou	150 ml/hl	

Précautions et Premiers Secours

Veillez consulter la notice à l'intérieur pour plus d'informations

Tenir hors de porté des enfants

Fabriqué par: Rotam Agrochemical Co. Ltd.
Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong,



Distribué par : SANABEL Agro
Z.I route Menzel Bourguiba - 7030 Mateur
Tél.: +216 72 466 484 - Fax : +216 72 465 483
E-mail : sanabelagro@topnet.tn

Date de fabrication:

N. du lot:

Validité: 2 ans à partir de la date de fabrication.



TN-AVANTAGE CT-LEAFLET-20180130

SIZE:210(W)X150(H)MM

AVANTAGE CT[®]

Fongicide préventif et curatif pour lutter contre le mildiou

Composition:

Avantage CT contient 500g/l Chlorothalonil et 100g/l Diméthomorphe sous forme de suspension concentrée SC

Caractéristique du produit:

Avantage CT intègre deux matières actives assurant une protection de haute performance contre le mildiou. Le Chlorothalonil appartient à la famille des chloronitriles. Il agit sur les spores des champignons pathogènes en inhibant les réactions enzymatiques. Le Diméthomorphe appartient au groupe chimique des dérivés de l'acide cinnamique qui grâce à sa triple action; il assure l'inhibition des zoospores, la destruction du mycélium et en tant que anti sporulant, il inhibe la biosynthèse des parois cellulaires

Recommandation d'utilisation :

Cultures	Maladie	Dose	DAR
Pomme de terre	Mildiou	150 ml/hl	14 Jours
Melon	Mildiou	150 ml/hl	

Préparation de la bouillie :

Remplir au $\frac{1}{4}$ ou au $\frac{1}{2}$ la cuve avec de l'eau propre, ajouter la quantité nécessaire d'Avantage CT, agiter et continuer le remplissage en maintenant l'agitation. Rincer les emballages vides au moins trois fois en ajoutant chaque fois cette eau de rinçage à la bouillie. Utiliser la bouillie le jour de sa préparation .Ne pas laisser une bouillie inemployée dans la cuve pendant des heures.

Compatibilité :

Avantage CT est compatible avec la plupart des autres pesticides. Il est cependant conseillé d'effectuer,un test de compatibilité sur une petite surface avant de généraliser le traitement.

Précautions générales

Lors de la préparation de la bouillie et lors de son application, il faut porter des vêtements de protection: combinaison spéciale imperméable, casquette, chaussures de travail et gants imperméables. Ne pas manger, boire et fumer pendant le traitement.

Si un malaise se fait sentir arrêter immédiatement le travail et appliquer les mesures de première urgence.

Après l'application du produit, se laver les mains et le visage avant de boire, manger et fumer.

A la fin de chaque opération de traitement phytosanitaire se laver soigneusement le corps. Nettoyer les vêtements de travail et de protection avant de les réutiliser.

En cas de contact avec la peau: Laver abondamment la peau avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau sous-jacente dès que possible.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement le centre anti-poison ou un médecin en étant muni de l'emballage ou l'étiquette.

En cas de contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment avec une solution oculaire ou de l'eau. Si les douleurs ou autres signes se manifestent et persistent, consulter un ophtalmologue.

Devenir des emballages vides

Les emballages vides ne doivent jamais être réutilisés: ils doivent être perforés, puis s'en débarrasser selon les législations locales en vigueur.

Classe de toxicité : CLASSE OMS : Peu dangereux, DANGEREUX.

Antidote

Pas d'antidote spécifique. Appliquer la thérapie symptomatique.

Centre anti poison 71 33 55 00

Conditions de stockage

CONSERVER SOUS CLÉ, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Stocker dans un local aéré loin du soleil et de l'humidité dans les emballages d'origine à l'écart des aliments et des boissons. Eviter les températures supérieures à 35°C.

Durée de stockage

Le produit peut être stocké au moins deux ans à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine fermé

Garantie et responsabilité :

Le fabricant garantit la qualité du produit à condition qu'il soit remis à l'utilisateur dans l'emballage d'origine intact.

Risque pour l'utilisateur :

L'utilisateur assume les risques pour les préjudices résultants des facteurs indépendants de la volonté du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour les préjudices dus à un stockage ou une utilisation du produit non conforme aux recommandations.

Homologation N° : F.002-17

Fabriqué par: Rotam Agrochemical Co. Ltd.

Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong,



Distribué par : SANABEL Agro

Z.I route Menzel Bourguiba - 7030 Mateur

Tél.: +216 72 466 484 - Fax : +216 72 465 483

E-mail : sanabelagro@topnet.tn



Trademark of Rotam Cropsciences Limited

TM : Marque enregistrée et déposée par **ROTAM**