



Milor M[®] ميلور م[®]

8% de Metalaxyl + 64% de Mancozebe, WP

مبيد فطري وقائي وعلاجي وجهازي لمقاومة المليديو

Fongicide systémique et de contact, pour la protection contre le mildiou.



SANABEL Agro

Z.I Route Menzel Bourguiba - 7030 Mateur

Tél.: +216 72 465 484 / Fax:72 465 483

E.mail: sanabelagro@topnet.tn

Milor M possède des propriétés systémiques et de contact. Le Metalaxyl (systémique) est transporté par la sève ascendante. il assure le contrôle et protège les jeunes pousses et les organes développés entre les deux applications. Le Mancozebe, matière active de contact, protège préventivement contre le Mildiou en formant un film protecteur qui couvre la surface foliaire et inhibe la germination des spores.



Culture	Maladie الامراض	Dose الجرعة	D.A.R فترة ما قبل الجني	الزراعة
Pomme de terre Tomate Cucurbitacées Vigne Fraisier	Mildiou المليديو	250 g/hl soit 2,5 Kg/ha 250 غ/اهل أي 2.5 كغ بالهكتار	3 jours 3 أيام	بطاطس طماطم قرعيات كروم فراولة
Tabac	Mildiou المليديو	300 g/hl غ/اهل	7 jours 7 أيام	تبغ
Légumineuses	Mildiou المليديو	250 g/hl غ/اهل	7 jours 7 أيام	بقوليات



Recommandations et Conseils d'application:

- Ne pas dépasser quatre applications par campagne sur la même culture par saison
- Traiter dès que les conditions sont favorables au développement de la maladie.
- L'intervalle d'application ne doit pas dépasser 14 jours. Si la dose et l'intervalle sont réduits, ne pas dépasser la dose recommandée par hectare et par saison et le temps d'exposition doit rester le même. Répéter par intervalle de 10 jours en situation de pression de la maladie. Appliquer en début de saison et en période de croissance végétative active.
- Adopter une stratégie de traitement préventif et non pas curative