

rombi ks

ENGRAIS NK SOLIDE SOLUBLE À HAUTE CONCENTRATION DE POTASSIUM ET EDTA.
APPLICATION FOLIAIRE ET RADICULAIRE



25kg

Formulation développée à base de potassium facilement assimilable par la plante.

Ce produit peut être utilisé comme source de potassium pour les cultures qui exigent une forte nutrition potassique pendant tout le cycle de la culture ou pendant les moments de plus grand besoin et/ou consommation.

L'utilisation de **ROMBI KS** est spécialement indiquée dans les cultures de légumes à racines (tubercules, bulbes, fruits ou semences comme : ail, oignon, betterave, pomme de terre, etc)

L'utilisation de **ROMBI KS** est spécialement indiquée dans les cultures à production de fruits (agrumes, fruit à noyau et fruit à pépin, olivier, vigne, maraichères, etc.).

ROMBI KS est une formule à haute teneur en potassium, avec des effets qualitatifs sur les cultures où il est appliqué (aux moments de plus grande consommation ou de besoins maximums pendant le cycle végétatif, devra être appliqué une ou plusieurs fois selon le type de culture).

Teneurs garanties

Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	50,00% p/p
Azote total (N)	5,20% p/p
Azote nitrique (N)	2,60% p/p
Azote ammoniacal (N)	2,60% p/p
Agent chélatant EDTA	11,00% p/p
pH (solución 1:25)	10,2

Cultures, doses et moments d'application

Cultures	Doses foliaires	Usage radiculaire
Agrumes, fruitiers	150-200 g/hl	20-40 kg/ha (plusieurs irrigations)
Maraîchage	150-250 g/hl	7-15 kg/ha (plusieurs irrigations)
Patate-betterave-tomate industrielle	150-250 g/hl	10-20 kg/ha (plusieurs irrigations)
Bananier		30-60 kg/ha (plusieurs irrigations)
Olivier-cotton	200-300 g/hl	
Vigne-raisin de table	1,5-2 kg/ha	7-15 kg/ha (plusieurs irrigations)

UTILISATION FOLIAIRE: RECOMMANDATION D'UTILISATION IMPORTANT

À cause du caractère basique et de sa formulation : l'utilisation foliaire doit être pratiquée sans aucun mélange, sauf si ces mélanges ont déjà été testés sur les cultures avec d'autres produits. Notre société recommande de faire attention au pH de la solution à utiliser dans les applications foliaires, et d'ajuster le pH autour de 6-6.5 en additionnant TRIPLE pH. Faire un essai en cas de doute.

AVANCER LA MATURATION DE LA RÉCOLTE.

ROMBI KS doit être utilisé par voie radiculaire à une dose de 10 grammes/plante entre 20-15 jours avant la récolte, et jusqu'à la fin de la récolte.

On recommande l'application simultanée de ROMBIORGAN L45-22, à une dose de 20-40 litres/ha.

ROMBI KS peut être utilisé par voie foliaire en suivant les recommandations ci-dessous :

- Appliquer seul.
- Contrôler le pH de la solution avec Triple pH.
- On peut appliquer 2-3 fois, s'il est connu que ces applications ne causent pas de problèmes. (essai préalable).
- Dès 25 jours et jusqu'à 7 jours avant récolte.

Dose d'application: 3 kg/ha dans un volume maximum de 1000 l/ha. Applications radiculaires avec ROMBIORGAN L45-22.