

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. Tenir hors de la portée des enfants.

كلوراماكس CHLORAMAX

التركيبة: 75% Chlorothalonil WP Composition :

مبيد فطري موضعي وقائي و علاجي

Fongicide de contact, préventif et curatif

بودرة سريعة الذوبان Poudre soluble dans l'eau

رخصة بيع رقم : Hom N°: F. 003-16

Contenance : 1 kg

العبوة : 1 كغ

Lot N°:

رقم الخلطة :

Date de production :

تاريخ الانتاج :



SANABEL Agro

Zone industrielle Mateur, 7030

Tél : 72 465 484 Fax : 72 465 483



SINON Corporation, Taiwan

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. Tenir hors de la portée des enfants.

كلوراماكس CHLORAMAX

التركيبة: 75% Chlorothalonil WP Composition :

Utilisations et doses homologuées :

Pomme de terre : Mildiou : 200 g/hl

Persistance d'action : Suivant les conditions climatiques et suivant la pression parasitaire, la rémanence de Chloramax va de 10 à 14 jours.

Compatibilité : Chloramax est compatible avec la plupart des autres pesticides. Il est cependant conseillé de réaliser un test de compatibilité sur une petite surface, avant de généraliser le traitement.

Délai avant récolte : 07 jours

Précautions d'utilisation :

Se laver les mains et le visage avant de boire, manger et fumer. Si une indisposition se manifeste arrêter immédiatement le travail et appliquer les mesures de première urgence.

Porter des habits de protection : combinaison de travail, chapeau ou casquette, chaussures de travail et gants imperméables. Ne pas manger, boire et fumer pendant le traitement.

Après le travail se laver soigneusement le corps. Nettoyer les habits de travail et de protection avant de les réutiliser.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec une solution oculaire ou de l'eau claire, en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 10 à 15 minutes. Consulter un spécialiste si une douleur ou une rougeur persiste.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau sous-jacente dès que possible.

Elimination du produit et de l'emballage : Les emballages vides doivent être bien rincés avec de l'eau pure puis s'en débarrasser selon les lois en vigueur. Les emballages ne doivent en aucun cas être réutilisés.

Antidote : Pas d'antidote spécifique, traiter symptomatiquement

Conditions de stockage : Stocker dans un local aéré fermé à clef loin du soleil et de l'humidité dans les emballages d'origine à l'écart des aliments et des boissons. Éviter les températures supérieures à 35°C.

Durée de stockage : Le produit peut être stocké au moins trois ans à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine fermé.

Responsabilité de l'utilisateur : Toutes les recommandations d'utilisation du produit sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. L'utilisateur est responsable de tout dommage résultant de facteurs indépendants du contrôle du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'un mauvais stockage ou d'une mauvaise utilisation.

الاستعمالات والمقادير المرخصة

البطاطا : البياض الزغبي : 200 غ/هل
مدة الفاعلية : حسب التساقطات المسجلة و ضغط الاصابة يمكن لكلوراماكس ان يحمي المحصول من 10 الى 14 يوما .

المدة الفاصلة بين المداوة و الجني : 7 ايام

إمكانية المزج : يمكن مزج كلوراماكس مع جل المبيدات المرخص بها . من المستحسن تجريب المزيج على مساحة صغيرة و التأكد من عدم إضراره بالزراعة قبل تعميم المداوة على كل المساحة المزروعة .

احتياطات الاستعمال :

اغسل اليدين و الوجه قبل الأكل و الشرب و التدخين .
ارتدي ملابس وقائية و مظلة و أحذية عمل و قفازات عند استعمال المبيد في حالة البلع : يجب استدعاء الطبيب فورا .
في حالة ملامسة المبيد للعين : يجب الغسل جيدا بهاء نظيفو ترك الجفنين مفتوحين لمدة 15 دقيقة .
في حالة ملامسة المبيد للجلد : يجب خلع الملابس الملوثة و الغسل بالماء و الصابون .
في حالة الاستنشاق يجب وضع المصاب في مكان مهووء مع القيام بالتنفس الاصطناعي في حالة توقف التنفس .

التخلص من النفايات : بعد تفريغ العبوات يجب غسلها جيدا بالماء و التخلص منها وفق القوانين المعمول بها محليا . كما يجب عدم استعمال العبوات الفارغة لأي غرض آخر .

احتياطات الخزن : اخزن المبيد في مكان مهووء و مغلق بعيدا عن متناول الأطفال و عن مخزونات الأكل و الشرب المعدة للإنسان و الحيوان . احفظ المبيد في مكان مخصص للأدوية الفلاحية و غير رطب و غير حار (أقل من 35 °) و في عبوته الأصلية .

مدة الخزن : يمكن خزن المبيد لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإنتاج في عبوته الأصلية المغلقة .

مسؤولية المستعمل : يجب على المستعمل أن يحترم طريقة و كمية الاستعمال . إن المستعمل هو المسؤول الوحيد على كل خلل يطرأ نتيجة عوامل خارجة على حدود مراقبة المصنع (استعمال خاطئ أو تخزين غير محكم) .



SANABEL Agro

Zone industrielle Mateur, 7030

Tél : 72 465 484 Fax : 72 465 483



SINON Corporation, Taiwan