

1L标签尺寸：278*135mm 红色框线为成品线 数量：4008张 制作时间：20106.9.19 请仔细核对内容和尺寸

Utilisation et dose homologuée :

Céréales : Dicotyledones : 3 L/ha

Caractéristiques du produit :

- SHARBENTA agit par effet de contact

- Pour profiter d'un désherbage efficace, il est important d'obtenir une couverture complète du feuillage considérant que c'est principalement par les feuilles que les mauvaises herbes absorbent l'herbicide.

- SHARBENTA résiste à l'entraînement par la pluie après 6 à 8 heures et devrait être appliqué en fonction du stade de croissance des mauvaises herbes. Toutefois, il est également important que la culture ait atteint un stade de croissance qui lui permet de tolérer le traitement.

- SHARBENTA maîtrise de nombreuses mauvaises herbes à feuilles larges, dont : Liseron des champs, moutarde des oiseaux, renoucle, canola spontané, chardon des champs, stellaire moyenne, gailllet grateron, renouée persicaire, chénopode blanc, moutarde des champs, morelle poilue, amarante....

- Appliquer SHARBENTA herbicide liquide lorsque les mauvaises herbes à feuilles larges sont petites et en croissance active.

Délais avant récolte : 14 jours

Précautions d'utilisation :

Se laver les mains et le visage avant de boire, manger et fumer. Si une indisposition se manifeste arrêter immédiatement le travail et appliquer les mesures de première urgence.

Porter des habits de protection : combinaison de travail, chapeau ou casquette, chaussures de travail et gants imperméables. Ne pas manger, boire et fumer pendant le traitement.

Après le travail se laver soigneusement le corps. Nettoyer les habits de travail et de protection avant de les réutiliser.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec une solution oculaire ou de l'eau claire, en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 10 à 15 minutes. Consulter un spécialiste si une douleur ou une rougeur persiste.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau sous-jacente dès que possible.

Antidote :

Pas d'antidote spécifique, traiter symptomatiquement

Durée de stockage :

Le produit peut être stocké au moins trois ans à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine fermé.

Centre anti poison : 71 33 55 00

Sharbenta

شربنتا

Composition : 480 g/l Bentazone SL : التركيبة

مبيد أعشاب انتقائي باللامسة

Herbicide sélectif de contact



Hom N° : H.004-13

رخصة بيع رقم :

Lot N° : 20160930

رقم الخلطة :

Date de production : 30th SEPTEMBER 2016

تاريخ الانتاج :

Contenance : 1 L

العبوة : 1 ل

Tenir hors de la portée des enfants يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

Avant d'ouvrir l'emballage lire les consignes de sécurité

Distribué en Tunisie par :



SANABEL Agro

Zone industrielle, 7030, Mateur

Tél : 72 465 484 Fax : 72 465 483

Fabriqué par :



SHARDA WORLDWIDE

EXPORTS Pvt Ltd

29 th Road, Bandra (West)

Mumbai - 400 050, India



الاستعمالات و المقادير المرخصة :

الحبوب : الاعشاب ذات الفلقتين : 3 ل في الهكتار

المدة الفاصلة بين المداواة و الجني : 14 يوم

إمكانية المرح :

يمكن مرح شربنتا مع جل المبيدات المرخص بها

احتياطات الإستعمال :

اغسل اليدين و الوجه قبل الأكل و الشرب و التدخين.

ارتدي ملابس وقائية و مظلة و أحذية عمل و قفازات عند استعمال المبيد

في حالة البلع: يجب استمعاء الطبيب فوراً.

في حالة ملامسة المبيد للعين: يجب الغسل جيدا بماء نظيف و ترك الجفنين مفتوحين لمدة 15 دقيقة.

في حالة ملامسة المبيد للجلد: يجب خلع الملابس الملوثة و الغسل بالماء و الصابون.

في حالة الاستنشاق يجب وضع المصاب في مكان مهوؤ مع القيام بالتنفس الاصطناعي في حالة توقف التنفس.

التخلص من النفايات :

بعد تفريغ العبوات يجب غسلها جيدا بالماء و التخلص منها وفق القوانين المعمول

بها محليا. كما يجب عدم استعمال العبوات الفارغة لأي غرض آخر.

احتياطات التخزين :

احزن المبيد في مكان مهوؤ و مغلق بعيدا عن متناول الأطفال و عن مخزونات الأكل

و الشرب المعدة للإنسان و الحيوان.

احفظ المبيد في مكان مخصص للأدوية الفلاحية و غير رطب و غير حار (أقل من

35 درجة) و في عبوته الأصلية.

مدة التخزين :

يمكن خزن المبيد لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإنتاج في عبوته الأصلية

المغلقة.

مسؤولية المستعمل :

يجب على المستعمل أن يحترم طريقة و كمية الاستعمال. إن المستعمل هو

المسؤول الوحيد على كل خلل بطراً نتيجة عوامل خارجة على حدود مراقبة المصنع

(استعمال خاطئ أو تخزين غير محكم).

مركز مقاومة التسمم: 71355500