



Vigostrene® فيقوستران®

Régulateur de croissance contenant 6 % de Fer sous forme EDDHA
Pour lutter contre les chloroses ferriques WG.

وقائي و علاجي , حبيبات قابلة للذوبان



Distribué par:

SANABEL Agro

Z.I Route Menzel Bourguiba - 7030 Mateur

Tél.: +216 72 465 484 - Fax: +216 72 465 483

E.mail: sanabelagro@topnet.tn



Vigostrene est un régulateur de croissance contenant 6 % de Fer sous forme EDDHA il permet la correction et prévention des carences en fer sur toutes cultures en l'apportant au sol à travers l'irrigation au goutte à goutte assurant ainsi à la plante une disponibilité durable du fer dans la solution du sol .

Vigostrene est commercialisé sous deux formes : le Vigostrene Premium contenant 4,8% du fer sous la forme O-O, et le Vigostrene contenant 4,2% du fer sous la liaison O-O. La Liaison O-O assure une persistance est une durabilité plus longue dans le sol.

Vigostrene peut être appliqué dissout dans l'eau d'irrigation. Il est entièrement soluble dans l'eau. Il peut être mélangé avec les autres fertilisants. L'application foliaire est aussi possible, ne pas dépasser la dose de 200 gr /100 litres d'eau. La solution à 0,1 % peut être utilisée pour le trempage des racines des plantes à la transplantation et au repiquage.

الاعراض الظاهرية لنقص الحديد في النباتات: تظهر الاعراض على الاوراق الحديثة و تتميز علامات نقص الحديد باصفرار الانسجة التي بين العروق مع بقاء العروق خضراء.



Cultures	Recommandations d'application
الزراعة	المقادير, فترة و طريقة الإستعمال
Fraisier الفراولة	30 à 40 Kg /ha fractionnés durant les périodes de végétation active. 30-40 كغ/هك : 2 كغ/هك كل أسبوع خلال أشهر النمو السريع
Agrumes القوارص	50 – 200 g/arbre selon l'âge et le degré de carence .Effectuer un apport fractionné en 2 : La moitié de la dose au démarrage de la pousse printanière, la deuxième moitié un mois après. 50 إلى 200غ/ شجرة: نصف الكمية عند انطلاق نمو الأوراق في الربيع (آخر فيفري أول مارس) و نصف الكمية الثاني بعد شهر
Arbres fruitiers تفاح, إجاص خوخ,عويينة	20 à 50 gr / pied fractionnés en 2 apports : le premier au débourrement, le deuxième un mois après. 20 إلى 50غ/شجرة: نصف الكمية عند بداية تفتح البراعم (آخر فيفري أول مارس حسب النوعية) و نصف الكمية بعد شهر
Vigne عنب الطاولة	10 à 40 gr/cep fractionnés en 2 apports : le premier au débourrement, le deuxième un mois après. 10 إلى 40غ/شجرة: نصف الكمية عند بداية تفتح البراعم (النصف الثاني من مارس حسب النوعية) و نصف الكمية بعد شهر
Cucurbitacées القرعيات	3 à 8 Kg/ha 20 jours après transplantation 3 إلى 8 كغ/هك: 20 يوما بعد تثقيب الشتلات
Pomme de terre البطاطا	3 à 8 Kg/ha 20 à 30 jours après plantation (un seul apport) 3 إلى 8 كغ/هك: 20 إلى 30 يوما بعد الزرع, بعد بزوغ 100 % من الاوراق
Tomate sous serres طماطم تحت البيوت المحمية	1 Kg/ha/semaine depuis l'apparition du premier bouquet floral jusqu'à la floraison du dernier bouquet. 15كغ/هك: 1 كغ/هك كل أسبوع ابتداء من الأسبوع الخامس بعد تثقيب الشتلات حتى أسبوعان قبل آخر جني