



# Acetade Fort<sup>®</sup> أسيتاد فور<sup>®</sup>

70% Acétamépride WP

Insecticide systémique agit par contact et ingestion sur les insectes piqueurs suceurs et les lépidoptères.



Sharda Cropchem Ltd



**SANABEL Agro**

Z.I Route Menzel Bourguiba - 7030 Mateur

Tél.: +216 72 465 484 / Fax:72 465 483

E.mail: [sanabelagro@topnet.tn](mailto:sanabelagro@topnet.tn)

[www.sanabelagro.com](http://www.sanabelagro.com)

**أهم الخصائص:** اسيتاد فور تأثر على الجهاز العصبي للحشرة و ذلك بملامسة المبيد أو عبر هضمه مما يؤدي الى اضطراب و شلل في جهاز الحشرة و موتها في النهاية و هو مضاد للبيض و اليرقات وكبار الحشرات

- اسيتاد فور له خاصيات جهازية تمكن من حماية البراعم و الاوراق و المحصول من غلال و فواكه .

- اسيتاد فور سريع الفاعلية العلاجية و حماية كاملة مدة 14 يوما.

**مدة الاستعمال قبل الجني :** الخضروات : 7 أيام

الاشجار المثمرة : 14 يوما



| Cultures                           | Parasites   | الاصابة | Dose d'application<br>كمية الاستعمال | الزراعة                    |
|------------------------------------|---|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| Agrumes                            | Mineuses, puceron   |         | 10 à 15 g/hl غ/هل                    | القوارص                    |
| Arbres fruitiers, vigne            | Puceron, cicadelle, thrips                                    |         | 15 g/hl غ/هل                         | الاشجار المثمرة والكروم    |
| Pomme de terre                     | Doryphore, puceron  |         | 10 g/hl غ/هل                         | البطاطا                    |
| Figuier                            | Mouche noire  |         | 10 g/hl غ/هل                         | التين                      |
| Pommier Poirier                    | Cécidomyies, charancon du feuillage et des fruits, Hoplocompe |         | 10 g/hl غ/هل                         | التفاح و الاجاص            |
|                                    | Puceron cendré, puceron vert, mineuse                         |         | 15 g/hl غ/هل                         |                            |
| Cultures sous serres               | Puceron, mouche blanche                                       |         | 15 g/hl غ/هل                         | الزراعات في البيوت المكيفة |
| Fraisier                           | Thrips, Puceron,  |         | 15 à 20 g/hl غ/هل                    | الفراولة                   |
| Tomate, Aubergine                  | Aleurode,   |         | 15 à 20 g/hl غ/هل                    | الطماطم والبادنجان         |
|                                    | Puceron   |         | 10 g/hl غ/هل                         |                            |
| Rosier, Cultures florales diverses | Puceron, thrips, noctuelles défoliatrices, cicadelle          |         | 15 g/hl غ/هل                         | الورود                     |
| Fèverole, céréales                 | Puceron vert, Puceron noir                                    |         | 10 à 15 g/hl غ/هل                    | القمح و الفول              |



**Acétade Fort** est un insecticide systémique de la famille des néonicotinoïdes. Il agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes, piqueurs suceurs et lépidoptères.

**Acétade Fort** est un insecticide systémique, il agit sur le système nerveux des insectes. Il permet une protection totale de l'ensemble de la plante traitée et des nouvelles pousses.

**Acétade Fort** est peu nuisible sur les abeilles. Toutefois pour les traitements en pleine floraison, il faut maintenir les ruches d'abeilles fermées 24h après le traitement.

**Acétade Fort** donne des meilleurs résultats en utilisant une eau de bouillie d'un pH neutre de 7.

**Acétade Fort** peut être mélangé avec tous les insecticides, fongicides et engrais foliaires non alcalins du marché.