



# PRYSTAR SL بريستار SL

300 g/l Clopyralid SL

Herbicide Anti dicotylédones en Post-levée  
des céréales et du colza

مبيد أعشاب في مزارع الحبوب والسلجم



Sharda Cropchem



Distribué en Tunisie par:



**SANABEL Agro**

Zone industrielle, 7030, Mateur

Tél : 72 465 484 Fax : 72 465 483



## الاستعمالات و المقادير المرخصة

القمح الشعير والسلجم : الاعشاب عريضة الاوراق :  
0.4 ل في الهكتار رش ورقي.

مرة واحدة لكل زراعة بالموسم. من مرحلة نهاية  
التجدير العقدة الثانية وعندما تكون الاعشاب الطفيلية  
في مرحلة 4 الى 6 اوراق.

يوصى برش المبيد بمعدل 200 الى 300 لتر من المحلول  
في الهكتار.

## Utilisations et doses homologuées

**Blé, orge et colza** : Adventices dicotylédones :  
0,4 L/ha. Pulvérisation foliaires.

Une application par saison et par culture. Appliquer  
au stade de fin tallage à 2 nœuds et quand les mau-  
vaises herbes sont au stade de 4 à 6 feuilles.



## Caractéristiques du produit :

- PRYSTAR SC est un herbicide systémique  
contre les dicotylédones annuelles de la famille  
des dérivés picoliniques.
- Pour une efficacité meilleure, il convient  
toujours d'ajuster la dose d'utilisation suivant le  
stade de développement de mauvaises herbes.



## Absorption et translocation :

Absorption rapide par le feuil-  
lage et les racines. La diffusion  
s'effectue rapidement dans la  
plante à la fois par le xylème et  
le phloème jusqu'aux tissus  
méristématiques.



## Mauvaises herbes sensibles

Chrysanthème résistante, chardon des champs,  
vesce jargeau, matricaire maritime, séneçon  
vulgaire, petite herbe à poux, marguerite blanche et  
petite oseille.

## Rémanence

Les cultures de rotation qui peuvent être utilisées l'année suivante une application  
de clopyralid sont le blé, l'orge, (toutes céréales sans légumineuse) et le colza.

