

# CIGAL PLUS

Cigal plus est un fongicide systémique associant deux matières actives complémentaires ; tébuconazole et chlorothalonil pour une efficacité renforcée et un large spectre d'action contre les principaux maladies cryptogamiques des différentes cultures.

سيقال بلس هو مبيد فطري جهازي يجمع بين عنصرين فعالين مكملين ؛ تيبوكونازول و كلوروثالونيل لتعزيز فعاليته ضد مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية الرئيسية لمختلف المحاصيل الزراعية

## • Composition :

Tébuconazole 125 g/l

تیبیکونازول 125 غ

Chlorothalonil 375 g/l

كلوروثالونيل 375 غ/ل

## • Formulation : sous forme de suspension concentrée SC

- علي شكل سائل مركز

## • Mode d'action :

Le tébuconazole est un fongicide systémique ayant une action protectrice, curative et éradiquante. Le tébuconazole est rapidement absorbé par les cultures, et bénéficie d'une translocation acropétale.

Le chlorothalonil est un puissant inhibiteur de la germination des spores et des zoospores. Il agit préventivement en inhibant les réactions enzymatiques chez ces derniers entraînant ainsi leur mort.

تتميز مادة تيبیکونازول بتغلغلها داخل أجزاء النبتة و تمنع الفطر من الإنتشار بينما تأثر مادة الكلوروثالونيل وقائيا بمنع نمو أبواغ الفطر وإختراق سطح الورقة.

## • Propriétés

Cigal plus a une efficacité renforcée et un large spectre d'action contre les principales maladies fongiques.

Cigal plus a deux modes d'action ; contact et systémique complémentaires ce qui permet de protégé les cultures à la surface comme à l'intérieur.



## أهم الخاصيات

يتميز بفاعليته الممتازة ضد العديد من الأمراض الفطرية  
يؤمن حماية شاملة لسطح الأوراق و كذلك الأنسجة الداخلية للنبته و ذلك بفضل طريقة إنتشاره للاصقة و  
الجهازية  
يتميز بفترة فاعلية طويلة

### • Doses et usages recommandées

Culture	Maladies	Dose
<b>Blé dur Blé tendre</b> القمح الصلب القمح اللين	Septoriose, rouille jaune Rouille brune, fusariose des épis, oïdium سبتوريوز - الصدا - فيزار يوز - البياض الدقيقي	2l/ha 2ل/هك
<b>Orge</b> الشعير	Helminthosporiose rhynchosporiose rouille, oidium هيلمنتوسبور يوز - رنكوسبور يوز الصدا - البياض الدقيقي	2l/ha 2ل/هك
<b>Triticale</b> التريتيكال	Septoriose, rouille سبتوريوز - الصدا	2l/ha 2ل/هك
<b>Légumineuses</b> البقوليات	<b>Rouille, Anthracnose</b> <b>oidium</b> الصدا - البياض الدقيقي انتركنوز	<b>1l/ha</b> <b>1ل/هك</b>
<b>Colza</b>	<b>Alterariose, Cylandrosporiose,</b> <b>Pseudocercosporiose et</b> <b>sclerotiniose</b>	<b>1l/ha</b> <b>1ل/هك</b>
<b>Pommier et poirier</b>	<b>Tavelure, oïdium</b>	<b>1l/ha</b> <b>1ل/هك</b>
<b>Pécher, Prunier</b>	<b>Rouille, Maladie de</b> <b>conservation et Oïdium</b>	<b>1l/ha</b> <b>1ل/هك</b>
<b>Tomate, Choux-fleur,</b> <b>Ail, Oignon et fraise</b>	<b>Oïdium, Rouille,</b> <b>Alternariose et Mildiou</b>	<b>125 ml/hl</b>
<b>Vigne</b>	<b>Oïdium, Black rot, Rougot</b> <b>parasitaire et Milodiou</b>	<b>125 ml/hl</b>

